



<보호자 제공용> 자료는
수의사 선생님의 진료 시 보호자에게 제공하여
진료의 만족도와 이해도를 높이는데
활용하실 수 있도록 제작하였습니다.

해당 파일을 인쇄하여 사용하실 수 있으며,
본원 로고를 삭제하여 배포와 공유 등에 제한 없이
편히 사용하실 수 있도록 제작하였습니다.

말라세치아성 피부염이란?

말라세치아성 피부염이란?

말라세치아성 곰팡이가 피부에 과증식하면서 피부 증상을 일으키는 질환을 의미합니다. 말라세치아는 정상적으로 귓바퀴, 입 주변, 항문 주변 등 피부 접합부에 살고 있지만, 수가 급격히 증식하거나 과민반응을 보일 경우 피부 증상이 나타나게 됩니다. 말라세치아의 감염은 주로 알레르기성 피부염에서 2차적으로 병발하게 되며 호르몬 질환, 각화 이상 등의 내재질환에 의해서도 발생할 수 있습니다. 발생 원인에 따라 지속적인 재발이 일어날 수 있으므로 1차적인 원인 질환에 대한 관리와 필요하며 보호자의 꾸준한 관심과 노력이 필요합니다.

임상 증상 및 진단

가장 대표적인 증상으로는 만졌을 때 피부가 기름지거나 끈적거리고 냄새가 나는 증상이며, 이외에도 노란색 각질, 발적, 태선화(코끼리 피부), 색소침착, 탈모 등의 증상이 나타납니다. 말라세치아성 피부염의 경우 임상증상 평가와 함께 병변부에서 테이프 검사를 통해 말라세치아 검출 및 염증세포를 검출함으로써 진단하게 됩니다.



치료 방법 설명

말라세치아성 피부염은 경구 항진균제 투약과 약욕을 병행하여 치료하게 됩니다. 또한 알레르기성 피부염 등 원발 원인에 대한 치료도 동시에 이루어져야 합니다.

- 경구 항진균제는 보통 8주 정도 투약하게 되며, 증상 개선 정도에 따라 투약 빈도와 기간을 조절합니다. 밥과 함께 먹어야 약물의 효과를 높일 수 있습니다.
- 경구 항진균제의 경우 장기간 투약할 경우 간수치 상승을 유발하는 경우가 있어 주기적인 간 수치 관련 혈액검사를 통해 부작용 여부를 확인하는 것이 중요합니다.
- 약욕은 처방받은 약용샴푸를 피부에 충분히 거품을 내어 마사지 한 후 10-15분간 피부에 흡수되도록 시간을 두고 물로 씻어내야 효과가 있습니다. 증상이 심하지 않은 환자의 경우 경구 항진균제 없이 약욕만으로도 증상의 개선을 기대해볼 수 있습니다.